



**ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ШАЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ДУБА-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

Адрес: с. Дуба-Юрт, ул. А-Х. Кадырова, 290

E-mail: duba-yrt_95@mail.ru индекс 366304

ПРОТОКОЛ

схода граждан Дуба-Юртовского сельского поселения

28 октября 2019 г.
13 час. 00 мин.

№ 12
с. Дуба-Юрт

Председатель схода:

Наурбиев Сайд-Хамзат Ахмадович - глава администрации Дуба-Юртовского
сельского поселения

Секретарь схода:

Ацаев Магомед-Арби Пахрудинович - специалист 1-го разряда

Присутствовало: 72 чел.

В работе схода приняли участие:

руководители организаций и учреждений, представители депутатского актива,
духовенства, совет сельского поселения, общественности
и участковой службы

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Усиление контроля за поступлением и реализацией мяса и мясной продукции без сопроводительной документации (ветеринарное свидетельство) в целях недопущения возникновения и распространения сибирской язвы.
2. Разное.

СЛУШАЛИ:

Наурбиев С-Х. А - глава администрации Дуба-Юртовского сельского поселения.

– сегодня мы собрались с целью предостеречь жителей села о необходимости соблюдать санитарные правила безопасности в процессе убоя и разделки крупного рогатого скота произведенном без предубойного ветеринарного осмотра.

Как нам стало известно, у жителей Республики Дагестан, Новолакского района зарегистрированы случаи заболевания сибирской язвой, причиной заражения послужило мясо крупного рогатого скота (быка) произведенном без предубойного ветеринарного осмотра в личном подсобном хозяйстве. Во избежание подобных случаев у нас, призываю

всех индивидуальных предпринимателей и граждан, занимающихся реализацией мяса и мясной продукции, проводить убой скота только после ветеринарного осмотра.

ВЫСТУПИЛИ: участковый уполномоченный полиции.

СЛУШАЛИ:

Дадаров Г.А. - ветеринарный врач Дуба-Юртовского сельского поселения.

- Источником заражения сибирской язвы чаще всего бывает почва (является естественным резервуаром), крупный и мелкий рогатый скот, лошади, верблюды, дикие животные – эти животные выделяют возбудителя со своими биологическими жидкостями. Пути передачи – контактный (через заражённые предметы быта продуктами жизнедеятельности животных или почвой), алиментарный (через заражённую пищу), воздушно-пылевой (через воздух), трансмиссивный (через эктопаразитов).

Симптомы сибирской язвы

Инкубационный период – время от момента внедрения возбудителя в макроорганизм и до первых клинических проявлений, может длиться при сибирской язве от нескольких часов до 8 дней, но чаще 2-3 дня. Длительность этого периода будет зависеть от путей проникновения и инфицирующей дозы возбудителя. Так, например, при контактном механизме передачи возникает кожная форма, и инкубационный период 2-14 суток, а при аэрогенном или алиментарном заражении возникает генерализованная форма, при которой инкубационный период длится всего несколько часов, а смерть наступает на 2-3 день.

Для профилактики необходимо своевременная диагностика с последующим лечением или забоем больных животных, эпизоотологическое обследование очага, обеззараживание трупов, уничтожение мяса/ шкур/ шерсти павших животных, текущая и заключительная дезинфекция в очаге, оздоровление скотомогильников/ пастбищ/ неблагоприятных по возбудителю территорий, а также плановая иммунизация живой сибирезвенной вакциной сельскохозяйственных животных в неблагоприятных пунктах.

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать имаму мечети сельского поселения Бериеву А.С. донести до жителей села информацию о необходимости соблюдать санитарные правила безопасности в процессе убоя и разделки крупного рогатого скота произведенном без предубойного ветеринарного осмотра

Председатель схода _____

Наурбиев С-Х.А.

Секретарь схода _____

Ацаев М-А.П.

